

Benigner essentieller Blepharospasmus

- Exzessives Blinzeln
Unwillkürlicher, krampfhafter Lidschluss
- Beidseitig
- Brauenptosis
- Sensorische Tricks
- Zerebrale Blendungsempfindlichkeit
- Stressoren
 - Helles Licht
 - Müdigkeit
 - Emotionaler Stress
- Rein klinische Diagnose!



Take home



Take home

Differentialdiagnosen

- **Benigner essenzieller Blepharospasmus:**
 - **Faziale Dystonie**
 - Beidseitiger Lidkrampf
 - + orofaziale Dystonie: Meige Syndrom
 - Diagnosestellung klinisch
 - Therapie: Botulinumtoxin alle (8 bis) 12 Wochen
- **Hemispasmus facialis:**
 - **Faziale Dystonie**
 - Halbseitiger Gesichtskrampf
 - Ursprung im Bereich des N. facialis
 - MRT z.A. Raumforderung im Verlauf des N. facialis
 - Therapie: Botulinumtoxin alle 12 Wochen
- **Synkinesien nach Fazialisparese:**
 - Unwillkürliche Mitbewegungen von Gesichtsmuskeln bei Gesichtsbewegungen
 - Fehlaussprossungen bei Regeneration des N. facialis
 - Therapie: Botulinumtoxin alle 12 Wochen
 - Bei Denervierungshypersensibilität geringer dosiert